



ISTITUTO COMPRENSIVO "T. GROSSI"
via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185
Codice Fiscale: 80125490153
istitutotommasogrossi@yahoo.it
www.icgrossimilano.edu.it

Milano, 15 novembre 2024
Circ. 68

Alle famiglie
Al personale
IC Grossi

Oggetto: pediculosi

Si ricorda a tutte le famiglie di **controllare attentamente e tutti i giorni il cuoio capelluto dei propri figli**, per verificare l'eventuale presenza di pidocchi.

Nelle comunità è infatti probabile la diffusione della pediculosi che non va considerata come un sintomo di scarsa pulizia o del quale ci si deve vergognare, ma che va affrontata tempestivamente.

Importante, nel **caso di presenza di lendini (uova) o pidocchi**, **intervenire subito con il trattamento specifico**, sentendo il medico o il farmacista e seguire le indicazioni riportate nell'allegato a questa circolare.

Dopo aver eseguito il trattamento, non vi sono limitazioni alla frequenza scolastica, nè occorre produrre alcuna certificazione.

Si allega la nota informative di ATS.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Milena Sozzi
Firma omessa
ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93

I pidocchi del capo sono parassiti specifici dell'uomo, si nutrono di sangue e non sopravvivono a lungo se allontanati dal cuoio capelluto (2-3 giorni).

Depongono uova (LENDINI) che si schiudono in 7-10 giorni (un pidocchio femmina può deporre fino a 300 uova sulla stessa persona). Le larve completano il loro sviluppo in 7-13 giorni.

Le uova sono attaccate alla base dei capelli con una sostanza collosa molto resistente. Le loro piccole dimensioni sono tali da sfuggire al normale pettine.

Il sintomo più caratteristico, ma non sempre presente, è il prurito al cuoio capelluto. I pidocchi si diffondono prevalentemente in condizioni di affollamento (scuole, oratori, colonie, ecc.) tramite contatto diretto con una persona infestata o indiretto attraverso veicoli (pettini, spazzole, capelli).

L'infestazione avviene indipendentemente dal livello di pulizia personale.

Informazioni utili

Sedi ATS MILANO di profilassi malattie infettive

Milano città e Nord Milano

Milano, Via Statuto, 5

malinfstatuto@ats-milano.it

Melegnano Martesana

Rozzano, Via Mognolie
Melzo, Via Mantova, 10

malinfrozzano@ats-milano.it
malinfmelzo@ats-milano.it

Lodi

Lodi, Piazza Ospitale, 10

malinflo@ats-milano.it

Ovest Milano

Parabiago, Via Spagliardi, 19

malinfparabiago@ats-milano.it
malinflegnano@ats-milano.it

Abbiategrasso, Via S. Francesco d'Assisi, 4

malinfabbiategrasso@ats-milano.it

Rhodense

Garbagnate Milanese, Via per Cesate, 62

malinfgarbagnate@ats-milano.it



ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI DEL CAPO

Sistema Socio Sanitario



ATS Milano
Città Metropolitana



COME SI ISPEZIONA IL CUOIO CAPPELLUTO

Bisogna sollevare molto lentamente i capelli facendoli scorrere contro pelo ed esaminarli accuratamente.

Osservando attentamente si evidenziano le lendini, lunghe circa un millimetro, che si differenziano dalla forfora per la forma ovoidale, sono più lucide e consistenti della forfora e hanno la consistenza di un granello di sabbia, sono aderenti al capello dal quale possono essere sfilate solo manualmente ad una ad una, mentre la forfora si stacca facilmente anche soffiando.

I punti in cui più facilmente si annidano i pidocchi e le loro lendini sono la nuca, le tempie e dietro le orecchie. I pidocchi sono di colore grigio-bruno e si vedono con difficoltà perché solitamente si confondono con il colore dei capelli.



TRATTAMENTO

È necessario utilizzare una lozione specifica antiparassitaria contro i pidocchi.

I prodotti agiscono uccidendo i pidocchi ma non sono altrettanto efficaci sulle uova: pertanto è indispensabile **rimuovere manualmente le uova dal capello.**

Per facilitarne il distacco si consiglia l'uso di una miscela calda costituita da metà acqua e metà aceto, passando i capelli con un pettine fitto.

Dopo una settimana, per eliminare i pidocchi nati da eventuali uova sopravvissute, bisogna ripetere il trattamento e la sfilatura manuale delle uova ancora presenti.

Non esistono trattamenti preventivi: il prodotto antiparassitario non previene l'infestazione, quindi non va utilizzato a scopo preventivo.



ULTERIORI PROVVEDIMENTI

CONTROLLARE tutti i componenti della famiglia

LAVARE in lavatrice (60°) o a secco federe, lenzuola, asciugamani e gli indumenti (in particolare cappelli, sciarpe ecc.) a contatto con il capo e con il collo; passare l'aspirapolvere su poltrone, divani, materassini e tappeti dove i bambini giocano. Pettini e spazzole vanno immersi in acqua bollente per 10 minuti. La disinfestazione dei locali non porta vantaggi poiché il pidocchio non è in grado di sopravvivere a lungo nell'ambiente.

Per evitare la diffusione del contagio si raccomanda alle famiglie, oltre alla normale igiene personale del bambino, un controllo frequente, almeno settimanale, dei capelli.

In caso di riscontro di infestazione, non c'è restrizione alla frequenza scolastica, a condizione che l'alunno sia stato sottoposto al primo trattamento antiparassitario. Non è necessario il certificato di ammissione in comunità.